

FICHA TÉCNICA



| | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------|
| Fecha de elaboración: | 10.09.2013 | Fecha de actualización: | 29.08.2016 |
| Elaboró | MEDSI | Revisó | EOXOM |
| Identificación de la empresa: | Bayer de México S.A. de C.V. División Bayer Environmental Science Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 259 Col. Ampliación Granada C.P. 11520 México, D.F. | | |
| Teléfonos de emergencia: | Bayer de México: (55) 5728 3000 ext. 7011 Seguridad Industrial, Planta Santa Clara: (55) 5699 14 82 SINTOX: (55) 5598 6659 Lada sin costo: 01 800 009 2800 | | |
| MAXFORCE® FLY BAYT | | | |
| “COMPOSICIÓN PORCENTUAL” | % en peso | | |
| Ingrediente activo: | 0.50 | | |
| Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolinin-2-ilidenamina (Equivalente a 5 g de i.a./Kg) | | | |
| Ingredientes inertes: | <u>99.50</u> | | |
| Atrayentes, emulsificante, floculante, espesante, colorante, antioxidante, portadores, antiaglomerante y amargante | | | |
| TOTAL | 100.00 | | |
| RSCO-URB-INAC-199-327-349-0.5 | | | |
| Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V. Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540 Tel.: 01 (55) 5728 3000 “HECHO EN HOLANDA” ® Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5 | Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V. Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada. C.P. 11520, México, D.F. Lada sin costo 01-800-229-37-27 servicioalcliente.crop@bayer.com www.saludambiental.com.mx | | |
| “EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA” | | | |
| “PRIMEROS AUXILIOS” | | | |
| Consejo general: retirar a la persona de la zona de intoxicación. Quitarle inmediatamente la ropa contaminada. Acostar y trasportar al afectado en posición lateral estable. En caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua, en caso de irritación llamar al médico de inmediato. En caso de contacto con la piel lavar profusamente con agua y jabón, en caso de presentarse irritación y que esta persista, llamar al médico de inmediato. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo permite, enjuagar la boca y dar a ingerir un vaso con agua. Consultar al médico inmediatamente. No provocar el vómito.. | | | |
| “RECOMENDACIONES AL MÉDICO” | | | |
| Insecticida del grupo químico de los cloronicotinilos. Signos y síntomas de intoxicación: en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. Tratamiento: sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos. Antídoto: no existe antídoto específico. | | | |
| URGENCIAS | | | |
| En caso de intoxicación llamar al SINTOX (24 horas, 365 días del año). Teléfonos 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01800 0092800. | | | |
| “GARANTIA” | | | |
| Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad. | | | |

FICHA TÉCNICA



“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

El uso de Maxforce® Fly Bayt es recomendado en esquemas de manejo integrado, en combinación con aspersiones residuales de insecticidas en las instalaciones. El manejo integrado reduce el riesgo de resistencia en la plaga.

“MÉTODO DE APLICACIÓN”

Maxforce® Fly Bayt es un cebo muy versátil en su aplicación en diversas zonas o instalaciones urbanas, tales como: casas-habitación; edificios públicos: hospitales, hoteles, oficinas, escuelas, piscinas, guarderías, iglesias, cines, teatros, plantas industriales, laboratorios, almacenes; bodegas, basureros y otros depósitos de desechos urbanos; medios de transporte; terrazas, patios, entradas a casas; establecimientos donde se manejan o procesan alimentos: cocinas, restaurantes, cafeterías, panaderías, supermercados, mataderos, industria alimentaria, áreas y plantas procesadoras de alimentos en general y comúnmente en todos aquellos lugares urbanos donde las moscas habitan y se desarrollan.

| PLAGAS | FORMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN | USOS |
|---|---|---|
| MOSCAS <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia</i> spp. y otras moscas urbanas | Esparcido Cubrir 200 m ² de superficie con 400 g de Maxforce® Fly Bayt | Cubrir la superficie del piso con Maxforce® Fly Bayt , especialmente en áreas externas perimetrales de las instalaciones, con la finalidad de atraer al exterior a las moscas. Evite formar montículos. Puede esparcirse sobre papel engomado y colgar este en el exterior o partes superiores de instalaciones. |
| | Con brocha Formar una pasta mezclando 100 g de Maxforce® Fly Bayt en 80 mL de agua para tratar de 45 a 50 m ² La pasta debe reposar de 1 a 2 h antes de la aplicación | Aplicar sobre marcos de puertas, ventanas y accesos a instalaciones, columnas de soporte, trabes, vigas, postes y puntos estratégicos en el exterior de instalaciones. |
| | Aspersión Mezclar 200 g de Maxforce® Fly Bayt en 2000 mL de agua (1: 10) | Utilizar boquilla de abanico plano 8002 u 8001 a baja presión. Asperjar sobre superficies: marcos de puertas, ventanas y accesos a instalaciones, columnas de soporte, trabes, vigas, postes y puntos estratégicos en el exterior de instalaciones. |
| | Colocar de 50 a 100 g de Maxforce® Fly Bayt en cajas, recipientes hondos o en su defecto, sobre papel engomado, a una altura de 1.5 a 2.5 m. | Uso en Interior de las instalaciones. |

Producto autorizado para usarse en la industria alimentaria y áreas de proceso de alimentos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Vigilar a diario la dotación de cebo hasta observar reducción de los índices de población de moscas.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar durante la temporada de moscas

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: En virtud del tipo de aplicación focalizado, el reingreso puede ser inmediato.

CONTRAINDICACIONES: No se mezcle con otros plaguicidas. No aplicar otros insecticidas sobre el cebo Maxforce® Fly Bayt

®Marca Registrada por Bayer Group